

## Anamnesebogen

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geb. Datum

1. Was sind Ihre Beschwerden und seit wann haben Sie Beschwerden?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Was ist Ihr Therapieziel?

\_\_\_\_\_

3. Handelt es sich um einen Arbeitsunfall?

nein

ja

welche BG und ggf. Aktenzeichen

\_\_\_\_\_

4. Sind Sie diesbezüglich schon einmal operiert worden?

\_\_\_\_\_

5. Haben Sie bereits Krankengymnastik oder andere konservative Therapien erhalten?

Krankengymnastik

Spritzen

Ultraschall

Bestrahlung

Einlagen

ortho. Schuhe

sonstiges

\_\_\_\_\_

6. Wer ist Ihr behandelnder Hausarzt?

\_\_\_\_\_

7. Wer ist Ihr behandelnder Orthopäde?

\_\_\_\_\_

8. Haben Sie Vorerkrankungen?

Gefäßerkrankung

Herzerkrankung

Erkrankung Schilddrüse

Diabetes

Rheuma

Nierenerkrankung

sonstiges

\_\_\_\_\_

9. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, wenn ja, welche?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. Sind Allergien bekannt und wenn ja, welche?

\_\_\_\_\_

11. Welchen Beruf üben Sie aus?

Beruf:

\_\_\_\_\_

Schüler

Rentner

Arbeitsunfähig

nein

ja

wenn ja, seit wann:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

*Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Beantwortung der Fragen genommen haben. Natürlich werden Ihre Angaben streng vertraulich behandelt.*

## Medikamentenplan

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte tragen Sie in diese Liste ihre aktuelle Medikation ein.

<b>Patientenname:</b>	<b>Geb. Datum:</b>
-----------------------	--------------------

**Beispiel:**

Zyloric	Gicht	300	Tbl.	1 - 0 - 0	ja
---------	-------	-----	------	-----------	----

Medikament	Grund der Einnahme Diagnose	Dosis	Dar- reichungs- form	Menge	Fortsetzung während stat. Aufenthalt

Bei Operationen bitte Medikamente für 3 Tage mitbringen. Folgende Medikamente müssen vor der Operation anästhesiebedingt abgesetzt werden: ASS 100 10 Tage vorher absetzen, Clopidogrel (**Plavix®**) 7 Tage vorher absetzen, Ticlopidin (z.B. **Tiklyd®**) 10 Tage vorher absetzen, Metformin 48 Std. vorher absetzen. Bei Behandlung mit Marcumar® Umstellung auf Heparine durch den Hausarzt